

TONOTIL N pulbere și soluție pentru soluție orală
L-fosfotreonină, L-glutamină, clorură de hidroxocobalamină
L-fosfoserină, clorhidrat de arginină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

TONOTIL N pulbere și soluție pentru soluție orală
L-fosfotreonină, L-glutamină, clorură de hidroxocobalamină
L-fosfoserină, clorhidrat de arginină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Pulbere pentru soluție orală (conținută în dop)
170 mg pulbere pentru soluție orală conțin L-fosfotreonină 20 mg, L-glutamină 75 mg, clorură de hidroxocobalamină 0,5 mg.

Soluție orală (conținută în flacon)
10 ml soluție orală conțin L-fosfoserină 60 mg, clorhidrat de arginină 150 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sorbitol. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere și soluție pentru soluție orală

10 flacoane x 10 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

VIANEX S.A.
Varibobi Street 8, Kifisia, 146 71, Grecia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9360/2016/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații terapeutice : stări de slăbiciune, stres (suprasolicitare fizică sau psihică), anorexie, convalescență.
Mod de administrare:
Adulți: doza recomandată este de 1-2 flacoane dimineața, înainte de micul dejun
Copii: doza recomandată este de 1 flacon dimineața, înainte de micul dejun
Soluția se administrează imediat după constituire.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

TONOTIL N pulbere și soluție pentru soluție orală

TONOTIL N pulbere și soluție pentru soluție orală
L-fosfotreonină, L-glutamină, clorură de hidroxocobalamină
L-fosfoserină, clorhidrat de arginină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**Etichetă de flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

TONOTIL N pulbere și soluție pentru soluție orală
L-fosfotreonină, L-glutamină, clorură de hidroxocobalamină
L-fosfoserină, clorhidrat de arginină

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Pulbere pentru soluție orală (conținută în dop)
170 mg pulbere pentru soluție orală conțin L-fosfotreonină 20 mg, L-glutamină 75 mg, clorură de hidroxocobalamină 0,5 mg.

Soluție orală (conținută în flacon)
10 ml soluție orală conțin L-fosfoserină 60 mg, clorhidrat de arginină 150 mg.

6. ALTE INFORMAȚII

Vianex S.A., Grecia