

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un mililitru soluție conține netilmicină 3 mg, sub formă de sulfat de netilmicină 4,55 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți:
Clorură de sodiu
Clorură de benzalconiu (sub formă de clorură de benzalconiu soluție)
Apă purificată.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături oftalmice, soluție
Un flacon cu picurător.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare oftalmică.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza în decurs de 28 zile de la prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

S.I.F.I. S.p.A.

Via Ercole Patti, 36, 95025 Aci S. Antonio (CT), Italia

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10811/2018/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. GENERAL CLASSIFICATION FOR SUPPLY

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală - PRF.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<PC: {număr} [cod medicament]

SN: {număr} [număr de serie]

NN: {număr} [număr de rambursare național sau alt număr național de identificare a medicamentului]>

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină
Administrare oftalmică

2. MOD DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:
A se utiliza în decurs de 28 zile de la prima deschidere.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL ÎN FUNCȚIE DE MASĂ, DE VOLUM SAU DE UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6. ALTE INFORMAȚII