

BANEOCIN 250 UI/5000 UI pe gram unguent
Zinc bacitracină/sulfat de neomicină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

BANEOCIN 250 UI/5000 UI pe gram unguent
Zinc bacitracină și sulfat de neomicină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram unguent conține zinc bacitracină 250 UI și neomicină 5000 UI sub formă de sulfat de neomicină.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lanolină anhidră și vaselină albă. (Vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Unguent
Tub a 20 g unguent
Tub a 5 g unguent

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7021/2014/01

7021/2014/02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații:

- infecții ale foliculilor piloși și infecții ale glandelor sudoripare
- tratamentul anumitor infecții și ulcerații de la nivelul pielii
- panariții
- tratamentul arsurilor și al leziunilor determinate de lichide fierbinți, suprainfectate
- tratamentul eczemelor, crăpăturilor și tăieturilor suprainfectate
- prevenirea infecțiilor apărute după intervenții chirurgicale la nivelul pielii.

Mod de administrare

Adulți și copii cu vârsta peste 2 ani

- Întindeți unguentul în strat subțire pe zona afectată de 2 până la 4 ori pe zi.
- Zona afectată poate fi acoperită cu un pansament.
- Evitați contactul cu ochii.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Baneocin unguent}

BANEOCIN 250 UI/5000 UI pe gram unguent
Zinc bacitracină/sulfat de neomicină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****Tub****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**BANEOCIN 250 UI/5000 UI pe gram unguent
Zinc bacitracină/sulfat de neomicină
Administrare cutanată**2. MODUL DE ADMINISTRARE****3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ20 g
5 g**6. ALTE INFORMAȚII**

{Sigla Sandoz GmbH}