

ASPIRIN PLUS C FORTE 800 mg/480 mg comprimate efervescente
Acid acetilsalicilic/acid ascorbic**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIASPIRIN PLUS C FORTE 800 mg/480 mg comprimate efervescente
Acid acetilsalicilic/acid ascorbic**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat efervescent conține acid acetilsalicilic 800 mg și acid ascorbic (vitamina C) 480 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sodiu. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL10 comprimate efervescente
20 comprimate efervescente**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**EXP.
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BAYER S.R.L.
Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1,
sector 1, 013681, București
România

Bayer (siglă)

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15180/2023/01 – cutie a câte 10 comprimate fervescente în folie termosudată,
15180/2023/02 – cutie a câte 20 comprimate efervescente în folie termosudată.

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații:

ASPIRIN PLUS C FORTE este utilizat

- pentru ameliorarea simptomelor durerilor ușoare până la moderate, cum sunt dureri de cap, dureri de dinți și dureri menstruale
- pentru tratamentul simptomatic al durerii și febrei din cadrul răcelii și gripei.
Nu luați acest medicament pentru mai mult de 3 zile pentru febră, sau 3-4 zile pentru durere, decât dacă medicul v-a recomandat astfel.
Administrare orală. Comprimatele efervescente se dizolvă într-un pahar cu apă înainte de a fi administrate. Comprimatele efervescente nu trebuie luate pe stomacul gol pentru a preveni iritația stomacului.

Doze:

Adulți

- doză unică: 1 comprimat efervescent
Doza unică poate fi repetată la intervale de minim 4 ore între doze dacă este necesar.
- doza zilnică maximă: 3 comprimate efervescente.

Adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste

Concentrația de 800 mg acid acetisalicilic / 480 mg acid ascorbic din ASPIRIN PLUC C FORTE ar putea să nu fie adecvată pentru tratament la adolescenți. La această categorie de vârstă sunt disponibile pentru utilizare alte medicamente care conțin doze mai mici de acid acetilsalicilic.

Copii cu vârsta mai mică de 12 ani

ASPIRIN PLUS C FORTE nu trebuie utilizat la copii.

Pacienții cu vârsta de peste 65 ani, pacienții cu greutate corporală mică, pacienții cu insuficiență hepatică sau insuficiență renală sau insuficiență cardiacă): A se citi prospectul pentru informații suplimentare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ASPIRIN PLUS C FORTE

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu se aplică

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu se aplică

ASPIRIN PLUS C FORTE 800 mg/480 mg comprimate efervescente
Acid acetilsalicilic/acid ascorbic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**
Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ASPIRIN PLUS C FORTE 800 mg/480 mg comprimate efervescente Acid
acetilsalicilic/acid ascorbic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Bayer (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII