

Faringo Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție
Flurbiprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie de carton**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Faringo Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție
Flurbiprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

O doză (3 pulverizări) conține flurbiprofen 8,75 mg.
O pulverizare conține flurbiprofen 2,92 mg. Un mililitru de spray bucofaringian soluție conține flurbiprofen 17,16 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Betadex (E459)
Hidroxipropilbetadex
Fosfat disodic dodecahidrat
Acid citric
Hidroxid de sodiu
Aromă de cireșe
Zaharină sodică (E954)

Compoziția calitativă a aromei de cireșe:

Substanțe aromatizante
Preparate aromatizante
Alcool etilic
Triacetat de gliceril (E1518)
Propilenglicol (E1520)
Acid ascorbic (E300)
Di-alfa-tocoferol (E307)
Apă

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray bucofaringian, soluție

Flacon cu 15 ml de soluție (88 pulverizări)

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Aruncați medicamentul la o lună după deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Terapia SA
Str. Fabricii, nr.124
Cluj-Napoca, România

Sigla Terapia - a SUN PHARMA company
Sigla SUN PHARMA

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15099/2023/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Faringo Intensiv este utilizat pentru ameliorarea de scurtă durată a simptomelor de la nivelul gâtului, cum sunt senzație de iritație în gât, durere, dificultate la înghițire și inflamație, la adulți cu vârsta de 18 ani și peste.

Adulți: o doză de 8,75 mg (3 pulverizări) în zona din spate a gâtului, la interval de 3-6 ore, după cum este necesar, până la maximum 5 doze (15 pulverizări) într-o perioadă de 24 ore. Nu utilizați acest medicament timp de mai mult de 3 zile.

Metoda de administrare: apăsați pompa **de trei ori**; aveți grijă să apăsați complet pompa, la fiecare pulverizare și să îndepărtați degetul de pe partea superioară a pompei de fiecare dată între pulverizări. Nu inhalați în timpul pulverizării.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

faringo intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Faringo Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție
Flurbiprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**
Eticheta de flacon (flacon PEÎD)**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Faringo Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție
Flurbiprofen

2. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Aruncați medicamentul la o lună după deschidere.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

15 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Sigla Terapia - a SUN PHARMA company