

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente
paracetamol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE / Folie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sodiu și sorbitol (E420).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat efervescent
6 comprimate efervescente
10 comprimate efervescente
12 comprimate efervescente
16 comprimate efervescente
20 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor și adolescenților.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Atenție! Dozele mai mari decât cele recomandate conduc către un risc de afectare hepatică foarte severă. Nu utilizați Paracetamol Accord dacă aveți probleme cu alcoolul sau dacă folosiți în același timp alte medicamente împotriva durerii care conțin paracetamol.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra în ambalajul primar original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa,
Polonia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15529/2024/01 – ambalaj cu 6 comprimate efervescente
15529/2024/02 – ambalaj cu 10 comprimate efervescente
15529/2024/03 – ambalaj cu 12 comprimate efervescente
15529/2024/04 – ambalaj cu 16 comprimate efervescente
15529/2024/05 – ambalaj cu 20 comprimate efervescente

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dizolvați comprimatele într-un pahar cu apă. Lăsați să se dizolve complet înainte de utilizare.

Indicații:

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente conține paracetamol, care aparține unui grup de medicamente denumite analgezice și antipiretice. Paracetamol Accord este utilizat în tratamentul durerii și/sau febrei ușoare până la moderate, cum ar fi febra asociată răcelilor, durerea de cap, durerea de dinți, durerile menstruale, durerile musculare sau articulare.

Doze recomandate:

Adulți și adolescenți cu greutatea peste 50 kg (peste 15 ani):

1-2 comprimate (500 mg-1 g) la fiecare 4 până la 6 ore, după cum este necesar.

În general, nu este necesar să se depășească 3 g paracetamol pe zi (6 comprimate în 24 de ore).

Doza maximă este de 8 comprimate (4 g) în 24 de ore în cazul durerii severe sau al febrei.

Adolescenți cu greutatea peste 40 kg (peste 12 ani):

Un comprimat (500 mg) la fiecare 4-6 ore, de 3 până la 4 ori în 24 de ore. Doza maximă este de 5 comprimate (2,5 g) în 24 de ore. Intervalul dintre doze trebuie să fie întotdeauna de cel puțin 4 ore.

Trebuie să discutați cu un medic dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă vă simțiți mai rău după 3 zile de tratament.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

paracetamol accord 500 mg comprimate efervescente

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente
paracetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

FOLIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente
paracetamol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Accord

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII

-

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente
paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE / Flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sodiu și sorbitol (E420).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat efervescent

6 comprimate efervescente
10 comprimate efervescente
12 comprimate efervescente
16 comprimate efervescente
20 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor și adolescenților.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Atenție! Dozele mai mari decât cele recomandate conduc către un risc de afectare hepatică foarte severă. Nu utilizați Paracetamol Accord dacă aveți probleme cu alcoolul sau dacă folosiți în același timp alte medicamente împotriva durerii care conțin paracetamol.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. Păstrați tubul bine închis, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa,
Polonia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15529/2024/06 – ambalaj cu 6 comprimate efervescente
15529/2024/07 – ambalaj cu 10 comprimate efervescente
15529/2024/08 – ambalaj cu 12 comprimate efervescente
15529/2024/09 – ambalaj cu 16 comprimate efervescente
15529/2024/10 – ambalaj cu 20 comprimate efervescente

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dizolvați comprimatele într-un pahar cu apă. Lăsați să se dizolve complet înainte de utilizare.

Indicații:

Paracetamol Accord este utilizat în tratamentul durerii și/sau febrei ușoare până la moderate, adică febra asociată răcelilor, durerea de cap, durerea de dinți, durerile menstruale, durerile musculare sau articulare.

Doze recomandate:

Adulți și adolescenți cu greutatea peste 50 kg (peste 15 ani):

1-2 comprimate (500 mg-1 g) la fiecare 4 până la 6 ore, după cum este necesar.

În general, nu este necesar să se depășească 3 g paracetamol pe zi (6 comprimate în 24 de ore).

Doza maximă este de 8 comprimate (4 g) în 24 de ore în cazul durerii severe sau al febrei.

Adolescenți cu greutatea peste 40 kg (peste 12 ani):

Un comprimat (500 mg) la fiecare 4-6 ore, de 3 până la 4 ori în 24 de ore. Doza maximă este de 5 comprimate (2,5 g) în 24 de ore. Intervalul dintre doze trebuie să fie întotdeauna de cel puțin 4 ore.

Trebuie să discutați cu un medic dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă vă simțiți mai rău după 3 zile de tratament.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

paracetamol accord 500 mg comprimate efervescente

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente
paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**ETICHETĂ / Flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Paracetamol Accord 500 mg comprimate efervescente
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sodiu și sorbitol (E420).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat efervescent

6 comprimate efervescente
10 comprimate efervescente
12 comprimate efervescente
16 comprimate efervescente
20 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor și adolescenților.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Atenție! Dozele mai mari decât cele recomandate conduc către un risc de afectare hepatică foarte severă. Nu utilizați Paracetamol Accord dacă aveți probleme cu alcoolul sau dacă folosiți în același timp alte medicamente împotriva durerii care conțin paracetamol.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. Păstrați flaconul bine închis, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa,
Polonia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15529/2024/06 – ambalaj cu 6 comprimate efervescente
15529/2024/07 – ambalaj cu 10 comprimate efervescente
15529/2024/08 – ambalaj cu 12 comprimate efervescente
15529/2024/09 – ambalaj cu 16 comprimate efervescente
15529/2024/10 – ambalaj cu 20 comprimate efervescente

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dizolvați comprimatele într-un pahar cu apă. Lăsați să se dizolve complet înainte de utilizare.

Doze recomandate:

Adulți și adolescenți cu greutatea peste 50 kg (peste 15 ani):

1-2 comprimate (500 mg-1 g) la fiecare 4 până la 6 ore, după cum este necesar.

În general, nu este necesar să se depășească 3 g paracetamol pe zi (6 comprimate în 24 de ore).

Doza maximă este de 8 comprimate (4 g) în 24 de ore în cazul durerii severe sau al febrei.

Adolescenți cu greutatea peste 40 kg (peste 12 ani):

Un comprimat (500 mg) la fiecare 4-6 ore, de 3 până la 4 ori în 24 de ore. Doza maximă este de 5 comprimate (2,5 g) în 24 de ore. Intervalul dintre doze trebuie să fie întotdeauna de cel puțin 4 ore.

Trebuie să discutați cu un medic dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă vă simțiți mai rău după 3 zile de tratament.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
