

Octeangin 2,6 mg pastile

diclorhidrat de octenidină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE DE CARTON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Octeangin 2,6 mg pastile

diclorhidrat de octenidină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține diclorhidrat de octenidină 2,6 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Ceilați excipienți sunt: isomalt (E 953), acid tartric, aromă de corectare a gustului amar (conține propilenglicol, extract de cafea și acid 4-(2,2,3-trimetilciclopentil) butanoic), ulei de anason stelat, ulei de mentă și sucraloză (E 955). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

12 pastile

16 pastile

20 pastile

24 pastile

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Cologne
Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14990/2023/01 – ambalaj cu 12 pastile
14990/2023/02 – ambalaj cu 16 pastile
14990/2023/03 – ambalaj cu 20 pastile
14990/2023/04 – ambalaj cu 24 pastile

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul adjuvant de scurtă durată al inflamației mucoasei bucale și gâtului, cu simptome tipice, cum sunt: durerea, înroșirea și inflamația.
Pentru adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste.

Dacă nu se recomandă altfel, adulții și adolescenții cu vârsta de 12 ani și peste trebuie să sugă în mod activ și continuu în cavitatea bucală o pastilă la fiecare 2-3 ore. Doza zilnică maximă este de 6 pastile.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Octeangin

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL
--

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
--

Nu este cazul.

Octeangin 2,6 mg pastile

diclorhidrat de octenidină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIA TERMOSUDATĂ**BLISTER PVC-PVDC/Al****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Octeangin 2,6 mg pastile

diclorhidrat de octenidină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII