

Strepsils Intensiv Cireșe și Mentă 8,75 mg/ doză spray bucofaringian, soluție
Flurbiprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Intensiv Cireșe și Mentă 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție
Flurbiprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

O doză (3 pulverizări) conține flurbiprofen 8,75 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: betadex, fosfat disodic dodecahidrat, acid citric monohidrat, parahidroxibenzoat de metil (E218), parahidroxibenzoat de propil (E216), hidroxid de sodiu, aromă de mentă, aromă de cireșe, N-2,3-trimetil-2-izopropil butanamidă, zaharină sodică, hidroxipropilbetadex, apă purificată.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray bucofaringian, soluție
15 ml (aproximativ 83 de pulverizări)

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Pentru utilizare la adulți

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza mai mult de 6 luni de la prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la frigider și a nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr.48, Clădirea Crystal Tower,
Etaj 11, Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15229/2023/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul rapid și eficient al durerilor în gât.

- Analgezic

- Antiinflamator
- Efectul durează până la 6 ore

Ameliorează durerea în gât în 5 minute.

Adulți cu vârsta peste 18 ani: o doză (3 pulverizări) administrată în partea din spate a gâtului, la interval de 3-6 ore, după cum este necesar. Nu administrați mai mult de 5 doze în 24 de ore.
Nu utilizați mai mult de 3 zile. Nu inhalați în timpul administrării.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Strepsils Intensiv Cireșe și Mentă 8,75 mg spray

**Strepsils Intensiv Cireșe și Mentă 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție
Flurbiprofen**

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Strepsils Intensiv Cireșe și Mentă 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție
Flurbiprofen

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare bucofaringiană

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza mai mult de 6 luni de la prima deschidere

4. SERIA DE FABRICAȚIE

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

15 ml

6. ALTE INFORMAȚII

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ:
15229/2023/01

DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ:
Reckitt Benckiser (România) S.R.L.