

Olynth Duo 1 mg/ml+50 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină/Dexpantenol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Olynth Duo 1 mg/ml+50 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină/Dexpantenol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de spray nazal, soluție conține clorhidrat de xilometazolină 1 mg și dexpantenol 50 mg.
O pulverizare conține 0,1 ml de spray nazal, soluție conținând clorhidrat de xilometazolină 0,1 mg și dexpantenol 5,0 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de potasiu, fosfat disodic dodecahidrat, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray nazal, soluție
10 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare nazală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONĂRE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

După prima deschidere, a se utiliza în decurs de 6 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght, Dublin 24,
Irlanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14904/2023/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Decongestionează nasul
Reduce inflamația
Ajută la vindecarea rănilor
Protejează mucoasa

Acest medicament este recomandat pentru utilizare la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 6 ani și peste. Medicamentul nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 6 ani.

Doze: 1 pulverizare în fiecare nară, de până la 3 ori pe zi.

Trebuie să discutați cu un medic dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău după 7 zile (3 zile la copii).

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Olynth Duo 1 mg/ml+50 mg/ml

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Olynth Duo 1 mg/ml+50 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină/Dexpantenol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI
ETICHETA FLACONULUI**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Olynth Duo 1 mg/ml+50 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină/Dexpantenol

Administrare nazală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAȚII