

**DULCOPIC 7,5 mg/ml, picături orale, soluție**  
Picosulfat de sodiu**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Dulcopic 7,5 mg/ml, picături orale, soluție  
Picosulfat de sodiu

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un mililitru picături orale, soluție (15 picături) conțin picosulfat de sodiu 7,5 mg

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și sorbitol (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Picături orale, soluție  
Un flacon a 15 ml  
Un flacon a 30 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Data deschiderii flaconului:  
A se agita flaconul înainte de utilizare.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP  
A se utiliza în maxim 6 luni după prima deschidere a flaconului.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

## **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

## **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Opella Healthcare Romania SRL  
Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etaj 8  
Sectorul 2, București, România

{sigla Opella}

## **12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

1270/2008/01 - {pentru cutia cu un flacon conținând 15 ml picături orale, soluție}

1270/2008/02 - pentru cutia cu un flacon conținând 30 ml picături orale, soluție}

## **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

## **14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Adulți și copii cu vârsta peste 10 ani: doza recomandată este de 10 – 20 picături Dulcopic 7,5 mg/ml (5 – 10 mg picosulfat de sodiu) în zilele în care este nevoie.  
La copii cu vârsta sub 10 ani medicamentul se va administra numai la recomandarea medicului.

Dulcopic trebuie administrat seara, efectul apărând în dimineața următoare.

Doze recomandate: conform indicațiilor din prospect.  
Trebuie să luați Dulcopic seara, pentru a se produce evacuarea în dimineața următoare.  
Dulcopic este eficient în aproximativ 6-12 ore de la administrare.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

{Dulcopic 7,5 mg/ml}

**DULCOPIC 7,5 mg/ml, picături orale, soluție**  
Picosulfat de sodiu**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****ETICHETA FLACONULUI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

DULCOPIC 7,5 mg/ml, picături orale, soluție  
Picosulfat de sodiu  
Administrare orală

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se agita flaconul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

15 ml  
30 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

{sigla Opella}