

PADUDEN Junior 40 mg/ml suspensie orală
Ibuprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR ȘI SECUNDAR****CUTIE**
ETICHETĂ DE FLACON**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

PADUDEN Junior 40 mg/ml suspensie orală
Ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 ml suspensie orală conține ibuprofen 40 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține: maltitol lichid (E 965), benzoat de sodiu (E 211), citrat de sodiu (E 331), zaharină sodică (E 954), clorura de sodiu și alți excipienți.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Suspensie orală

30 ml suspensie orală
100 ml suspensie orală
150 ml suspensie orală
200 ml suspensie orală

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se agita bine înainte de utilizare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

A se utiliza timp de 6 luni după deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare, dacă nu se deschide flaconul.

După deschidere păstrați flaconul la temperaturi sub 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Terapia SA

Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca

România

Sigla Terapia - a SUN PHARMA company (cutie și etichetă de flacon)

Sigla SUN PHARMA (numai pe cutie)

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16227/2025/01 – ambalaj cu 30 ml suspensie orală

16227/2025/02 – ambalaj cu 100 ml suspensie orală

16227/2025/03 – ambalaj cu 150 ml suspensie orală

16227/2025/04 – ambalaj cu 200 ml suspensie orală

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PADUDEN Junior este indicat pentru tratamentul simptomatic al febrei și pentru tratamentul durerii ușoare până la moderate la adulți și la copii cu vârstă peste 3 luni. A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

paduden junior 40 mg/ml suspensie orală

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.