

Aliflusin 500 mg/200 mg/4 mg granule efervescente
paracetamol/acid ascorbic/maleat de clorfeniramină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aliflusin 500 mg/200 mg/4 mg granule efervescente
paracetamol/acid ascorbic/maleat de clorfeniramină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare plic conține 500 mg paracetamol, 200 mg acid ascorbic, 4 mg maleat de clorfeniramină.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Acest medicament conține sodiu, sucroză și glucoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule efervescente

10 plicuri de granule efervescente
20 plicuri de granule efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
Granulele efervescente trebuie dizolvate într-un pahar cu apă caldă. A se consuma imediat după preparare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Acest medicament conține paracetamol.

A nu se depăși doza recomandată. Doze mai mari decât cele recomandate pot produce afecțiuni grave ale ficatului. Consultați imediat medicul în caz de supradozaj. Nu luați alte medicamente care conțin paracetamol. Dacă aveți boli ale ficatului sau dacă aveți probleme cu consumul de alcool, nu luați acest medicament fără recomandarea medicului.

Nu luați împreună cu alte medicamente pentru gripă și răceală.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C.

A se păstra în ambalajul original bine închis pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Natur Produkt Zdovit Sp. z o.o.31 Nocznickiego
01-918 Varșovia
Polonia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14666/2022/01- ambalaj cu 10 plicuri

14666/2022/02- ambalaj cu 20 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aliflusin este indicat pentru tratamentul pe termen scurt al simptomelor de gripă, răceală și din stări asemănătoare gripei, cum sunt durere de cap, febră, dureri în gât, în special însoțite de rinoree, la adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani.

Utilizați Aliflusin doar dacă aveți o combinație de simptome de răceală și gripă, cum ar fi dacă aveți dureri/febră și vă curge nasul.

Febră

Durere de cap

Dureri în gât

Secreție nazală apoasă

Doza recomandată este de un singur plic la nevoie, de până la 3 ori pe zi, la un interval de cel puțin 4 ore între doze. Doza zilnică maximă de 3 plicuri nu trebuie depășită într-un interval de 24 de ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Aliflusin granule efervescente

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Aliflusin 500 mg/200 mg/4 mg granule efervescente
paracetamol/acid ascorbic/maleat de clorfeniramină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI)
plicuri laminate PAP/Aluminiu/PE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Aliflusin 500 mg/200 mg 4 mg granule efervescente
paracetamol/ acid ascorbic/maleat de clorfeniramină

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Granulele efervescente trebuie dizolvate într-un pahar cu apă caldă. A se consuma imediat după preparare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE CODURILE DONAȚIEI ȘI MEDICAMENTULUI

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAȚII

Febră
Secreție nazală apoasă
Durere de cap
Dureri în gât

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

31 Nocznickiego
01-918 Varşovia
Polonia