

THERAFLU RĂCEALĂ ȘI TUSE 500 mg/6,1 mg/100 mg capsule
Paracetamol/ Clorhidrat de fenilefrină/ Guaifenezină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Theraflu răceală și tuse 500 mg/6,1 mg/100 mg capsule
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină/Guaifenezină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

O capsulă Theraflu răceală și tuse conține paracetamol 500 mg, clorhidrat de fenilefrină 6,1 mg, guaifenezină 100 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Capsule
8 capsule
16 capsule

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală. A nu se mesteca capsula.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Haleon Romania S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2),
Sector 5, București,
România

Sigla Haleon

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14272/2022/01 - cutie cu 1 blister din PVC/hârtie/Al a 8 capsule.
14272/2022/02 - cutie cu 2 blistere din PVC/hârtie/Al a câte 8 capsule.

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Theraflu răceală și tuse este utilizat pentru tratamentul pe termen scurt al simptomelor răcelii, gripei și al frisoanelor. Aceste simptome includ dureri ușoare și moderate, febră, congestie nazală (nas înfundat) și tuse productivă, din piept. Theraflu răceală și tuse are și un efect expectorant, ajutând astfel în cazul tusei productive, însoțite de eliminarea de flegmă.

Adulți, vârstnici și adolescenți cu vârsta de 16 ani și peste, cu greutatea de 50 kg și peste:

2 capsule la interval de 4-6 ore, după cum este necesar, până la 6 capsule (3 doze a câte 2 capsule) în 24 de ore. Nu utilizați mai mult de 3 zile. Capsulele se înghit nemestecate, cu o cantitate suficientă de lichid.

Nu se administrează copiilor și adolescenților cu vârsta sub 16 ani sau adolescenților cu vârsta între 16 și 18 ani, cu greutatea mai mică de 50 kg.

A NU SE DEPĂȘI DOZA RECOMANDATĂ. Adresați-vă unui medic în cazul în care simptomele persistă mai mult de 3 zile sau dacă se agravează.

Conține paracetamol. Nu luați în același timp cu oricare alte medicamente care conțin paracetamol.

În caz de supradozaj, adresați-vă imediat medicului, chiar dacă vă simțiți bine.

Nu utilizați împreună cu niciun alt medicament pentru tratamentul tusei, răcelii sau pentru nas înfundat sau cu alcool etilic.

A nu se utiliza de către femeile gravide sau care alăptează.

Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă:

- luați alte medicamente în momentul de față,
- sunteți sub îngrijiri medicale.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Theraflu răceală și tuse capsule

THERAFLU RĂCEALĂ ȘI TUSE 500 mg/6,1 mg/100 mg capsule
Paracetamol/ Clorhidrat de fenilefrină/ Guaifenezină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE****Blister****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Theraflu răceală și tuse 500 mg/6,1 mg/100 mg capsule
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină/Guaifenezină**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**Haleon Romania S.R.L.
Sigla Haleon**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII