

Gaviscon Forte cu aromă de fructe de pădure suspensie orală
alginat de sodiu/hidrogenocarbonat de sodiu/carbonat de calciu**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PE
AMBALAJUL PRIMAR
CUTIE/ETICHETA FLACONULUI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Gaviscon Forte cu aromă de fructe de pădure suspensie orală
alginat de sodiu/hidrogenocarbonat de sodiu/carbonat de calciu

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare doză de 10 ml conține alginat de sodiu 500 mg, hidrogenocarbonat de sodiu 213 mg și carbonat de calciu 325 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sodiu, calciu, parahidroxibenzoat de metil (E218) și parahidroxibenzoat de propil (E216) și propilenglicol (E1520). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
600 ml

Un flacon cu o măsură dozatoare.

5. MODUL ȘI CĂILE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală. A se agita bine înainte de utilizare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTE ATENȚIONĂRI

Dacă simptomele persistă după 7 zile, adresați-vă medicului dumneavoastră. Conținut crescut de sodiu. Conține calciu. Dacă vi s-a recomandat o dietă cu conținut redus din oricare dintre acestea, vă rugăm să vă adresați medicului înainte de a lua acest medicament. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

Înainte de prima utilizare, verificați ca sigiliul de pe capac să nu fie distrus.

8. DATA EXPIRĂRII

EXP: LL/AAAA.

A se utiliza în decurs de 6 luni de la deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Reckitt Benckiser (România) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11, Sector 1, București,
România

12. NUMERELE AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

<Flacon din sticlă brună>

15576/2024/01 – ambalaj cu 150 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/02 – ambalaj cu 200 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/03 – ambalaj cu 250 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/04 – ambalaj cu 300 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/05 – ambalaj cu 500 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/06 – ambalaj cu 600 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

<Flacon din sticlă brună acoperită cu roz>

15576/2024/07 – ambalaj cu 150 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/08 – ambalaj cu 200 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/09 – ambalaj cu 250 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/10 – ambalaj cu 300 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/11 – ambalaj cu 500 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

15576/2024/12 – ambalaj cu 600 ml suspensie orală și o măsură dozatoare

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratamentul arsurilor gastrice, regurgitației acide și indigestiei.

- Aromă de fructe de pădure

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: la apariția simptomelor, luați 10-20 ml, după mese și înainte de culcare, maxim de patru ori pe zi.

Copii cu vârsta sub 12 ani: nu se recomandă administrarea la copii cu vârsta sub 12 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

<Doar pe cutie>

Gaviscon Forte cu aromă de fructe de pădure