

**Vitamina C Béres 100 mg/ml picături orale, soluție
acid ascorbic****INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Vitamina C Béres 100 mg/ml picături orale soluție
acid ascorbic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un ml produs (20 picături) conține 100 mg acid ascorbic (vitamina C).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL****Flacon cu picături**

Picături orale soluție

1×30 ml

2×30 ml

4×30 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU
TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Păstrare: a se păstra la temperaturi sub 25°C.
Poate fi folosit până la 4 luni de la prima deschidere a flaconului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Deținătorul autorizației de punere pe piață:
Béres Pharmaceuticals Ltd.
H-1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.,
Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15664/2024/01-cutie cu 1 flacon
15664/2024/02-cutie cu 2 flacoane
15664/2024/03-cutie cu 4 flacoane

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații: prevenirea și tratamentul afecțiunilor cauzate de deficitul de vitamina C.

Contraindicații: dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele ale acestui medicament; dacă ați avut sau aveți litiază renală.

Dozare:

Doza uzuală în funcție de vârstă:

	Prevenirea deficitului de vitamina C	Tratamentul deficitului de vitamina C
0 – 3 ani	5 picături (25 mg)	10 picături (50 mg)
4 – 9 ani	10 picături (50 mg)	20 picături (100 mg)
10 – 14 ani	10 picături (50 mg)	1× sau 2×20 picături (100 – 200 mg)*
Adolescenți peste 15 ani și adulți	20 picături (100 mg)	1× sau 2×20 picături (100 – 200 mg)*

* în funcție de nevoi și afecțiuni

Se administrează prin picurare într-o lingură în formă concentrată, sau diluată (de exemplu amestecată în lapte, suc de fructe sau alimente).

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Vitamina C Béres 100 mg/ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

--

Prospect: Informații pentru utilizator

Vitamina C Béres 100 mg/ml picături orale, soluție
acid ascorbic

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE

Vitamina C Béres 100 mg/ml picături orale soluție
acid ascorbic

Administrare orală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Doza uzuală în funcție de vârstă:

	Prevenirea deficitului de vitamina C	Tratamentul deficitului de vitamina C
0 – 3 ani	5 picături (25 mg)	10 picături (50 mg)
4 – 9 ani	10 picături (50 mg)	20 picături (100 mg)
10 – 14 ani	10 picături (50 mg)	1× sau 2×20 picături (100 – 200 mg)*
Adolescenți peste 15 ani și adulți	20 picături (100 mg)	1× sau 2×20 picături (100 – 200 mg)*

* în funcție de nevoi și afecțiuni

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ
--

30 ml

6. ALTE INFORMAȚII

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Păstrare: a se păstra la temperaturi sub 25°C.

Deținătorul autorizației de punere pe piață:
Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest, Ungaria