

Octicide 1 mg/g+ 20 mg/g spray cutanat, soluție
diclorhidrat de octenidină/fenoxietanol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE DE CARTON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Octicide 1 mg/g+ 20 mg/g spray cutanat, soluție
diclorhidrat de octenidină /fenoxietanol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

1 g de spray cutanat, soluție conține: diclorhidrat de octenidină 1 mg, fenoxietanol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Cocamidopropil betaină soluție 38% (cocamidopropil betaină, acid gras din nucă de cocos, glicerină, apă, conține clorură de sodiu), gluconat de sodiu, glicerol 85%, soluție de hidroxid de sodiu 10%, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray cutanat, soluție

50 ml
250 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu inhalați aerosoli în timp ce efectuați aplicarea cu pulverizatorul mecanic.

Nu permiteți Octicide să treacă în circulația sanguină, de exemplu prin injectare accidentală.

Nu amestecați Octicide cu alți compuși, în special nu utilizați în combinație cu antiseptice pe bază de iod-povidonă pe zonele învecinate ale pielii, deoarece pot apărea modificări de culoare de la brun intens până la violet.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După prima deschidere, Octicide trebuie utilizat în decurs de 12 luni, dar fără să se depășească data expirării.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ENEO Pharmaceuticals s. r. o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
Cehia

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16249/2025/01 – ambalaj cu flacon a 50 ml
16249/2025/02 – ambalaj cu flacon a 250 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul antiseptic repetat și de scurtă durată al rănilor superficiale. Octicide este recomandat pentru utilizare sub formă nediluată, imediat după producerea leziunii sau la primele semne de inflamație.

Aplicați Octicide o dată pe zi pe zona afectată, prin pulverizare repetată cu pulverizatorul mecanic, până la umezirea completă a zonei afectate. Nu utilizați acest medicament mai mult de 14 zile.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Octicide

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL
--

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
--

<Nu este cazul.>

Octicide 1 mg/g+ 20 mg/g spray cutanat, soluție
diclorhidrat de octenidină /fenoxietanol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR****Etichetă flacon PEÎD****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Octicide 1 mg/g+ 20 mg/g spray cutanat, soluție
diclorhidrat de octenidină /fenoxietanol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

1 g de spray cutanat, soluție conține: diclorhidrat de octenidină 1 mg, fenoxyetanol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Cocamidopropil betaină soluție 38% (cocamidopropil betaină, acid gras din nucă de cocos, glicerină, apă, conține clorură de sodiu), gluconat de sodiu, glicerol 85%, soluție de hidroxid de sodiu 10%, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray cutanat, soluție

50 ml
250 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu inhalați aerosoli în timp ce efectuați aplicarea cu pulverizatorul mecanic.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După prima deschidere, Octicide trebuie utilizat în decurs de 12 luni, dar fără să se depășească data expirării.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ENEO Pharmaceuticals s. r. o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
Cehia

12. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16249/2025/01 – ambalaj cu flacon a 50 ml
16249/2025/02 – ambalaj cu flacon a 250 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul antiseptic repetat și de scurtă durată al rănilor superficiale.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>