

Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic
Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic
Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic
paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic
Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic
Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic conține 250 mg paracetamol.
Fiecare plic conține 500 mg paracetamol.
Fiecare plic conține 1000 mg paracetamol.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic conține benzoat de sodiu (E211) și urme de alcool benzilic.
Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic conține benzoat de sodiu (E211) și urme de alcool benzilic.
Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic conține benzoat de sodiu (E211) și urme de alcool benzilic.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule în plic.

<Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic>

8 plicuri
10 plicuri
16 plicuri
20 plicuri

<Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic >

8 plicuri
10 plicuri
16 plicuri
20 plicuri

<Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic >
8 plicuri
10 plicuri

<Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic>
aromă de căpșuni

<Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic>
aromă de zmeură

<Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic>
aromă de zmeură

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

Granulele trebuie administrate direct în gură, pe limbă și trebuie înghițite fără apă. Granulele nu trebuie mestecate.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison,
Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

<Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic>

16018/2025/01 – ambalaj cu 8 plicuri

16018/2025/02 – ambalaj cu 10 plicuri

16018/2025/03 – ambalaj cu 16 plicuri

16018/2025/04 – ambalaj cu 20 plicuri

<Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic>

16019/2025/01 – ambalaj cu 8 plicuri

16019/2025/02 – ambalaj cu 10 plicuri

16019/2025/03 – ambalaj cu 16 plicuri

16019/2025/04 – ambalaj cu 20 plicuri

<Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic>

16020/2025/01 – ambalaj cu 8 plicuri

16020/2025/02 – ambalaj cu 10 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Acest medicament conține paracetamol: analgezic (calmează durerea) și antipiretic (scade febra). Este indicat pentru tratamentul simptomatic al durerii ușoare până la moderate și/sau al febrei.

<Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic>

INDICAT LA COPII ȘI ADOLESCENȚI cu o greutate corporală cuprinsă între 14 și 50 kg (cu vârsta aproximativ între 2 și 15 ani).

A se citi prospectul înainte de utilizare.

<Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic>

INDICAT LA ADULȚI, ADOLESCENȚI ȘI COPII cu greutate corporală mai mare de 27 kg (cu vârsta de aproximativ 8 ani sau peste).

A se citi prospectul înainte de utilizare.

<Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic>

INDICAT LA ADULȚI ȘI ADOLESCENȚI cu o greutate corporală de 50 kg sau mai mare (cu vârsta peste 15 ani).

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic

Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic

Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 16018/2025/01-02-03-04
16019/2025/01-02-03-04
16020/2025/01-02

Anexa 3

Informații privind etichetarea

Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic
Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic
Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic
paracetamol

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI
Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic
Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic
Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic
Paracetamol
Administrare orală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală fără apă. Nu mestecați.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

<Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic>
250 mg în plic
<Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic>
500 mg în plic
<Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic>
1000 mg în plic

6. ALTE INFORMAȚII

<Fervex Durere și Febră Instant 250 mg granule în plic>

aromă de căpșuni

<Fervex Durere și Febră Instant 500 mg granule în plic>
aromă de zmeură

<Fervex Durere și Febră Instant Forte 1000 mg granule în plic>
aromă de zmeură

A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR.