

Minoxidil Medinfar 50 mg/ml soluție cutanată
minoxidil**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIMinoxidil Medinfar 50 mg/ml soluție cutanată
minoxidil**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare mililitru de soluție cutanată conține 50 mg de minoxidil.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: propilenglicol și etanol (96%). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție cutanată

1 x 60 ml soluție
3 x 60 ml soluție

Cu aplicator, pentru o administrare mai localizată.

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Utilizare cutanată.

Minoxidil Medinfar este destinat exclusiv utilizării externe și trebuie aplicat numai pe scalp.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Atenționări:

A se evita inhalarea medicamentului și a se evita contactul cu ochii, mucoasele și pielea afectată de excoriații, inflamații sau leziuni. Dacă se întâmplă acest lucru, zona afectată trebuie spălată bine cu apă de la robinet din abundență. Trebuie solicitat sfatul medicului dacă senzația de arsură și/sau iritația persistă.

UTILIZARE EXTERNĂ**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 12 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C. A nu se păstra la frigider sau congela.

A se ține flaconul bine închis.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua Henrique Paiva Couceiro, 29, Venda Nova
2700-451 Amadora Losboa
Portugalia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16087/2025/01 – ambalaj cu 3 flacoane a câte 60 ml

16087/2025/02 – ambalaj cu 1 flacon a 60 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**Indicații terapeutice:**

Pentru tratamentul alopeciei androgenice la bărbați.

Doze:

Minoxidil Medinfar este destinat exclusiv aplicării locale la nivelul scalpului.

Părul și scalpul trebuie să fie bine uscate înainte de aplicarea locală a Minoxidil Medinfar.

Aplicați 1 ml de soluție, apăsând pompa de pulverizare de 6 ori, de două ori pe zi, la interval de 12 ore, în centrul zonei afectate a scalpului și întindeți-o cu vârful degetelor, pentru a vă asigura că medicamentul este distribuit uniform.

Modul de aplicare:

În funcție de dispozitivul de aplicare furnizat, procedați după cum urmează:

Pompă dozatoare de pulverizare: aplicați 1 ml de soluție, apăsând pompa de pulverizare de 6 ori.

Aplicator: scoateți partea de sus a capacului recipientului și introduceți aplicatorul. Aplicați 1 ml de soluție, apăsând aplicatorul de 6 ori.

Spălați-vă bine pe mâini după fiecare aplicare.

Curățarea pompei dozatoare de pulverizare și a aplicatorului

Îndepărtați partea de sus a capacului recipientului sau aplicatorul și clătiți cu alcool după fiecare utilizare, pentru a curăța reziduurile de medicament și pentru a evita înfundarea.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Minoxidil Medinfar 50 mg/ml soluție cutanată

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Minoxidil Medinfar 50 mg/ml soluție cutanată
minoxidil**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR****Flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Minoxidil Medinfar 50 mg/ml soluție cutanată
minoxidil**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare mililitru de soluție cutanată conține 50 mg de minoxidil.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: propilenglicol, etanol (96%). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Flacon cu 60 ml soluție cutanată

60 ml

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Utilizare cutanată.

Minoxidil Medinfar este destinat exclusiv utilizării externe și trebuie aplicat numai pe scalp.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**UTILIZARE EXTERNĂ**

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 12 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C. A nu se păstra la frigider sau congela.

A se ține flaconul bine închis.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua Henrique Paiva Couceiro, 29, Venda Nova
2700-451 Amadora Losboa
Portugalia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16087/2025/01 – parte a unui ambalaj cu 3 flacoane a câte 60 ml

16087/2025/02 – parte a unui ambalaj cu 1 flacon a 60 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****Indicații terapeutice:**

Pentru tratamentul alopeciei androgenice la bărbați.

Doze:

Minoxidil Medinfar este destinat exclusiv aplicării locale la nivelul scalpului.

Părul și scalpul trebuie să fie bine uscate înainte de aplicarea locală a Minoxidil Medinfar.

Aplicați 1 ml de soluție, apăsând pompa de pulverizare de 6 ori, de două ori pe zi, la interval de 12 ore, în centrul zonei afectate a scalpului și întindeți-o cu vârful degetelor, pentru a vă asigura că medicamentul este distribuit uniform.

Modul de aplicare:

În funcție de dispozitivul de aplicare furnizat, procedați după cum urmează:

Pompă dozatoare de pulverizare: aplicați 1 ml de soluție, apăsând pompa de pulverizare de 6 ori.

Aplicator: scoateți partea de sus a capacului recipientului și introduceți aplicatorul. Aplicați 1 ml de soluție, apăsând aplicatorul de 6 ori.

Spălați-vă bine pe mâini după fiecare aplicare.

Curățarea pompei dozatoare de pulverizare și a aplicatorului

Îndepărtați partea de sus a capacului recipientului sau aplicatorul și clătiți cu alcool după fiecare utilizare, pentru a curăța reziduurile de medicament și pentru a evita înfundarea.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE
