

Cathejell 17,31 mg/g 0,5 mg/g gel
lidocaină/diclorhidrat de clorhexidină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cathejell 17,31 mg/g /0,5 mg/g gel
Substanțe active: lidocaină/diclorhidrat de clorhexidină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1g gel conține 17,31 mg lidocaină și 0,5 mg diclorhidrat de clorhexidină.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: hidroxietilceluloză, glicerol, soluție lactat de sodiu, apă pentru preparate injectabile, soluție hidroxid de sodiu, soluție de acid lactic.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel anestezic hidrosolubil, clar, steril, incolor

5 seringi unidoză de tip acordeon a 12,5 g gel uretral
25 seringi unidoză de tip acordeon a 12,5 g gel uretral

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Calea de administrare: uretrală sau pentru aplicare pe sonde, endoscoape și tuburi traheale

A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se administra doar de către un medic sau o asistentă medicală calificată.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

De unică utilizare. A se arunca gelul rămas.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra blisterul în ambalajul original de carton, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
6067 Absam, Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16295/2025/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Se eliberează pe bază de prescripție medicală- PRF. Disponibil doar în farmacii.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Gel steril cu efect local anestezic și antibacterian pentru anestezia mucoaselor și lubrefiant în cateterizare, endoscopie, sondare și intubație traheală

Sterilizat cu aburi și, în consecință, fără parabeni

Limpede – anestezic - hidrosolubil

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Na

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL
--

<cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
--

<PC: {număr} [cod medicament]

SN: {număr} [număr de serie]

Cathejell 17,31 mg/g /0,5 mg/g gel
lidocaină/ diclorhidrat de clorhexidină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ**Blister****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Cathejell 17,31 mg/g /0,5 mg/g gel
Substanțe active: 1 g gel anestezic hidrosolubil conține 17,31 mg lidocaină și 0,5 mg diclorhidrat de clorhexidină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
6067 Absam, Austria }

Sigla Montavit

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:
De unică utilizare. A se arunca gelul rămas.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT:

5. ALTE INFORMAȚII

12,5 g gel pentru instilare.
Citiți prospectul înainte de utilizare.
Păstrați blisterul în cutie, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Cathejell 17,31 mg/g /0,5 mg/g gel
lidocaină, diclorhidrat de clorhexidină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Seringă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Cathejell

2. MODUL DE ADMINISTRARE**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

12,5 g

6. ALTE INFORMAȚII

Montavit