

**Prospect: Informații pentru utilizator****Gerocilan 20 mg comprimate filmate**  
Tadalafil

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Gerocilan și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Gerocilan
3. Cum să luați Gerocilan
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Gerocilan
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Gerocilan și pentru ce se utilizează**

Gerocilan este folosit pentru tratamentul bărbaților cu disfuncție erectilă. Aceasta este situația când un bărbat nu poate să aibă sau să-și mențină penisul întărit, în erecție, așa cum este necesar pentru activitatea sexuală. Tadalafil a dovedit că îmbunătățește semnificativ capacitatea bărbaților de a obține erecția penisului pentru activitatea sexuală.

Gerocilan conține substanța activă tadalafil, care face parte din grupul de medicamente numite inhibitori de fosfodiesterază tip 5. În urma stimulării sexuale, Gerocilan acționează ajutând vasele de sânge din penis să se relaxeze și să permită pătrunderea unei cantități mai mari de sânge în penis. Rezultatul este îmbunătățirea funcției erectile. Gerocilan nu vă va fi de ajutor dacă nu aveți disfuncție erectilă.

Este important să rețineți că Gerocilan nu acționează dacă nu există stimulare sexuală. Trebuie ca dumneavoastră și partenera dumneavoastră să vă angajați în preludiu ca și cum nu ați lua nici un medicament pentru disfuncția erectilă.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Gerocilan**

Nu luați Gerocilan:

- dacă sunteți alergic la tadalafil sau la oricare dintre celelalte componentele ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).
- dacă luați orice formă de nitrat organic sau donori de oxid nitric, de exemplu: nitrit de amil. Acesta este un grup de medicamente („nitrați”) folosite în tratamentul anginei pectorale („dureri în piept”). S-a

demonstrat că tadalafil crește efectele acestor medicamente. Dacă luați orice formă de nitrați sau nu sunteți sigur de aceasta, adresați-vă medicului dumneavoastră.

- dacă aveți o boală gravă de inimă sau ați avut un infarct miocardic în ultimele 90 zile.
- dacă ați avut un accident vascular cerebral în ultimele 6 luni.
- dacă aveți tensiune arterială scăzută sau tensiune arterială crescută și necontrolată medicamentos.
- dacă ați avut vreodată pierdere a vederii datorită neuropatiei optice anterioare ischemice non-arteritice (NOAIN), afecțiune descrisă ca „accident vascular al ochiului”.
- dacă luați riociguat. Acest medicament este utilizat pentru tratarea hipertensiunii arteriale pulmonare (de exemplu: tensiune mare a sângelui la nivelul plămânilor) și a hipertensiunii pulmonare tromboembolice cronice (de exemplu: tensiune mare a sângelui la nivelul plămânilor, secundar cheagurilor de sânge). Inhibitorii de PDE5, cum este tadalafil, s-au dovedit a mări efectul hipotensor al acestui medicament. Dacă luați riociguat sau dacă nu sunteți sigur de acest lucru, spuneți medicului dumneavoastră.

### **Atenționări și precauții.**

Înainte să utilizați Gerocilan, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Trebuie să știți că activitatea sexuală implică un risc posibil pentru pacienții cu boli de inimă, din cauză că supune inima la un efort suplimentar. Dacă aveți o problemă cu inima, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Înainte de a lua acest medicament, spuneți-i medicului dumneavoastră dacă aveți:

- siclemie (o afecțiune a globulelor roșii din sânge).
- mielom multiplu (cancer al măduvei osoase).
- leucemie (cancer al celulelor sângelui).
- orice deformare a penisului.
- o problemă gravă la ficat.
- o problemă gravă la rinichi.

Nu se cunoaște dacă Gerocilan este eficace la pacienții cărora le-au fost efectuate:

- intervenții chirurgicale pelvine.
- îndepărtarea în întregime sau a unei părți a prostatei în care nervii prostatei sunt tăiați (prostatectomie radicală fără protecția inervației).

Dacă aveți brusc o scădere sau pierdere a vederii sau vederea dumneavoastră este distorsionată, estompată în timp ce luați Gerocilan, opriți administrarea Gerocilan și luați imediat legătura cu medicul dumneavoastră.

La unii pacienți care utilizează tadalafil s-a observat o scădere sau o pierdere bruscă a auzului. Deși nu se cunoaște dacă acest eveniment este direct legat de utilizarea tadalafilului, dacă aveți brusc o scădere sau pierdere a auzului, opriți administrarea Gerocilan și luați imediat legătura cu medicul dumneavoastră.

Gerocilan nu este destinat utilizării de către femei.

### **Copii și adolescenți**

Gerocilan nu este destinat utilizării de către copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

### **Gerocilan împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu luați Gerocilan dacă luați deja tratament cu nitrați.

Unele medicamente pot fi influențate de Gerocilan sau pot influența modul în care acționează Gerocilan.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați deja:

- blocante alfa-adrenergice (utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale sau simptomelor urinare asociate cu hiperplazia benignă de prostată).
- alte medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale.
- riociguat.
- un inhibitor de 5-alfa reductază (utilizat pentru a trata hiperplazia benignă de prostată).
- medicamente cum sunt ketoconazol comprimate (pentru tratamentul infecțiilor fungice) și inhibitori ai proteazei pentru tratamentul SIDA sau al infecției cu HIV.
- fenobarbital, fenitoină sau carbamazepină (medicamente anticonvulsivante).
- rifampicină, eritromicină, claritromicină sau itraconazol.
- alte tratamente pentru disfuncție erectilă.

### **Gerocilan împreună cu alimente sau băuturi**

Informații referitoare la efectul alcoolului etilic se află la pct. 3. Sucul de grapefruit poate să influențeze modul în care acționează Gerocilan și trebuie consumat cu prudență. Discutați cu medicul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

### **Fertilitatea**

În urma administrării la câini, s-a observat diminuarea formării spermei în testicule. Scăderea concentrației spermei a fost observată și la unii bărbați. Este puțin probabil ca aceste efecte să determine pierderea capacității de reproducere.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Unii bărbați care au luat tadalafil în timpul studiilor clinice au raportat amețeli. Verificați cu atenție cum reacționați la aceste comprimate înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Gerocilan conține lactoză.**

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

## **3. Cum să luați Gerocilan**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Gerocilan este destinat numai administrării orale la bărbați. Înghițiți comprimatul întreg, cu puțină apă. Comprimatele pot fi luate cu sau fără alimente.

**Doza recomandată pentru început** este de un comprimat de 10 mg luat înainte de activitatea sexuală.

Cu toate acestea, dumneavoastră vi s-a prescris doza de un comprimat de 20 mg deoarece medicul dumneavoastră a decis că doza recomandată de 10 mg este prea slabă.

Puteți lua un comprimat Gerocilan cu cel puțin 30 minute înainte de activitatea sexuală. Gerocilan poate fi eficace până la 36 ore după ce ați luat comprimatul.

Nu luați Gerocilan mai des de o dată pe zi. Gerocilan 10 mg și 20 mg este destinat utilizării înainte de activitatea sexuală anticipată și nu este recomandat pentru utilizare zilnică.

Este important să rețineți că Gerocilan nu acționează dacă nu există stimulare sexuală. Dumneavoastră și partenera dumneavoastră va trebui să vă angajați în preludiviu, ca și când nu ați lua un medicament pentru

disfuncție erectilă.

Consumul de alcool etilic vă poate afecta capacitatea de a obține o erecție și vă poate scădea temporar tensiunea arterială. Dacă ați luat sau planificați să luați Gerocilan, evitați consumul excesiv de alcool etilic (alcoolemie de 0,08% sau mai mare), deoarece acesta poate crește riscul de apariție a amețelilor când vă ridicați în picioare.

#### **Dacă luați mai mult Gerocilan decât trebuie**

Adresați-vă medicului dumneavoastră. Puteți să prezentați reacțiile adverse descrise la pct. 4.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. În mod normal, aceste reacții adverse sunt de natură ușoară până la moderată.

#### **Dacă manifestați oricare dintre următoarele reacții adverse, încetați să mai luați medicamentul și mergeți imediat la medic:**

- reacții alergice, inclusiv erupții trecătoare pe piele (posibilitate de apariție mai puțin frecventă)
- durere în piept – nu luați nitrați și mergeți imediat la medic (posibilitate de apariție mai puțin frecventă)
- priapism, o erecție prelungită și posibil dureroasă după utilizarea Gerocilan (posibilitate rară de apariție). Dacă aveți o astfel de erecție care durează fără întrerupere timp de mai mult de 4 ore, trebuie să mergeți imediat la medic
- pierdere bruscă a vederii (posibilitate rară de apariție), **vedere distorsionată, estompată, vedere centrală încețoșată sau diminuare bruscă a vederii (cu frecvență necunoscută)**

Au fost raportate și alte reacții adverse:

#### **Frecvente** (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- dureri de cap, dureri de spate, dureri musculare, dureri ale brațelor și membrilor inferioare, înroșire a feței, congestie nazală și indigestie.

#### **Mai puțin frecvente** (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- amețeli, dureri de stomac, greață, vărsături, reflux gastro-esofagian, vedere încețoșată, dureri oculare, dificultate la respirație, prezența sângelui în urină, erecție prelungită, senzație de bătăi accentuate ale inimii, frecvență cardiacă crescută, tensiune arterială crescută, tensiune arterială scăzută, sângerări din nas, țiuit în urechi, umflare a mâinilor, picioarelor sau a gleznelor și senzație de oboseală.

#### **Rare** (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

- stare de leșin, crize convulsive și pierderi trecătoare ale memoriei, umflare a pleoapelor, ochi roșii, scădere bruscă sau pierdere a auzului, urticarie (vezicule roșii pe suprafața pielii), sângerare la nivelul penisului, prezența sângelui în lichidul seminal și transpirații în exces.

Rareori, la bărbații care iau tadalafil s-au raportat atac de inimă și accident vascular cerebral. Cei mai mulți dintre aceștia au avut probleme cardiace cunoscute înainte de a lua acest medicament.

S-a raportat rar scăderea sau pierderea parțială, temporară sau permanentă, a vederii la un ochi sau la ambii ochi.

**Au fost raportate și alte reacții adverse rare** la bărbații care iau tadalafil, reacții care nu au fost întâlnite în studiile clinice. Aceste reacții includ:

- migrenă, umflare a feței, reacție alergică severă care determină umflare a gâtului sau a feței, erupții pe piele severe, unele afecțiuni care modifică circulația sângelui la nivelul ochilor, bătăi neregulate ale inimii, angină pectorală și moarte de origine cardiacă.
- vedere distorsionată, estompată, vedere centrală încețoșată sau diminuare bruscă a vederii (cu frecvență necunoscută)

A fost raportată mai frecvent amețeala la pacienții în vârstă de peste 75 ani care iau tadalafil. Diareea a fost raportată mai frecvent la pacienții în vârstă de peste 65 de ani care iau tadalafil.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Gerocilan**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Gerocilan**

- Substanța **activă** este tadalafil.  
Gerocilan 20 mg: fiecare comprimat filmat conține tadalafil 20 mg.
- Celelalte componente sunt:

#### Nucleu

Lactoză

Croscarmeloză sodică

Laurilsulfat de sodiu

Hidroxiopropilceluloză

Polisorbat 80

Stearat de magneziu

### Film

Hipromeloză 2910 (E 464)

Lactoză monohidrat

Dioxid de titan (E 171)

Triacetină

Talc (E 553b)

Oxid galben de fer (E 172)

### **Cum arată Gerocilan și conținutul ambalajului**

Gerocilan 20 mg: comprimate filmate, de culoare galbenă, de forma unei pilule, biconvexe, inscripționate cu „T 20” pe una dintre fețe și netede pe cealaltă.

Gerocilan 20 mg este disponibil în cutii cu blistere din PVC/PVdC/Al care conțin 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricanții**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.

Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria

#### **Fabricanții**

Genepharma S.A.

18th km Marathonos Avenue, 15351 Pallini, Grecia

Combino Pharm (Malta) Ltd.

HF60, Hal Far Industrial Estate, BBG3000, Malta

Pharmadox Healthcare Ltd.

1KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.

Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria

### **Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:**

Austria: Gerocilan 20 mg Filmtabletten

Bulgaria: Gerocilan 20 mg филмирани таблетки

Țările de Jos: Gerocilan 20 mg filmomhulde tabletten

Polonia: Gerocilan

România: Gerocilan 20 mg comprimate filmate

Republica Slovacia: Gerocilan 20 mg filmom obalené tablety

Ungaria: Gerocilan 20 mg filmtabletta

**Acest prospect a fost revizuit în august 2024.**