

Prospect: Informații pentru utilizator**Ibuprofen Strides 600 mg comprimate filmate**
ibuprofen

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe administrarea acestui medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Ibuprofen Strides și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Ibuprofen Strides
3. Cum să luați Ibuprofen Strides
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Ibuprofen Strides
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Ibuprofen Strides și pentru ce se utilizează

Ibuprofen Strides conține substanța activă ibuprofen. Ibuprofen aparține grupei de medicamente numite AINS (antiinflamatoare nesteroidiene). Ibuprofen Strides ameliorează durerea și are un efect antiinflamator.

La adulți și adolescenți cu vârsta de 15 ani și peste (greutate ≥ 50 kg) este utilizat pentru tratamentul simptomatic al durerii și inflamației în boli artritice (de exemplu, poliartrită reumatoidă), boli degenerative ale articulațiilor (de exemplu, artroză) și în caz de umflare și inflamație, însoțite de durere, ca urmare a leziunilor țesuturilor moi.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Ibuprofen Strides**Nu luați Ibuprofen Strides dacă:**

- sunteți alergic la ibuprofen sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament, enumerate la pct. 6.
- ați avut vreodată o reacție alergică (de exemplu, bronhospasm (constricția mușchilor din plămâni, care poate cauza astm bronșic și dificultăți la respirație), crize de astm bronșic, rinoree, umflare în interiorul nasului, erupție trecătoare pe piele sau umflare bruscă a feței) după ce ați luat acid acetilsalicilic sau alte analgezice similare (AINS).
- aveți insuficiență hepatică, renală sau cardiacă severă
- vă aflați în ultimele trei luni de sarcină (vezi pct. „Sarcina și alăptarea”)
- aveți în prezent sau ați avut ulcer gastric/duodenal (ulcer peptic) recidivant sau o sângerare (cel puțin 2 episoade distincte de ulcer sau sângerare confirmate)

- aveți antecedente de sângerare sau perforație gastrointestinală asociate cu un tratament anterior cu AINS
- aveți o sângerare la nivelul creierului (sângerare vasculară cerebrală) sau altă sângerare activă
- sunteți sever deshidratat (de exemplu din cauza vărsăturilor, diareii sau unui aport insuficient de lichide)
- aveți tulburări de formare a sângelui de cauze neclarificate
- aveți o afecțiune care determină creșterea tendinței de sângerare.

Atenționări și precauții

Medicamentele antiinflamatoare/analgezice, cum este ibuprofenul, pot fi asociate cu un risc ușor crescut de infarct miocardic sau accident vascular cerebral, mai ales atunci când sunt utilizate în doze mari. Nu depășiți doza sau durata recomandată a tratamentului.

În cazul administrării de ibuprofen au fost raportate semne de reacție alergică la acest medicament, incluzând probleme la respirație, umflare a feței și a regiunii gâtului (angioedem), durere în piept. Opriti imediat administrarea Ibuprofen Strides și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau serviciului de ambulanță dacă observați oricare dintre aceste semne.

Aveți grijă deosebită cu Ibuprofen Strides:

În asociere cu tratamentul cu ibuprofen au fost raportate reacții grave la nivelul pielii, incluzând dermatită exfoliativă, eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, reacție la medicament asociată cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS), pustuloză exantematică generalizată acută (PEGA). Încetați să utilizați Ibuprofen Strides și adresați-vă imediat unui medic dacă observați oricare dintre simptomele asociate cu aceste reacții grave la nivelul pielii descrise la pct. 4.

Înainte să luați Ibuprofen Strides, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:

- aveți probleme ale inimii, inclusiv insuficiență cardiacă, angină pectorală (durere în piept) sau dacă ați avut un infarct miocardic, o intervenție chirurgicală de bypass, dacă aveți o boală arterială periferică (circulație deficitară la nivelul picioarelor sau al labelor picioarelor, din cauza unor artere îngustate sau blocate) sau orice tip de accident vascular cerebral (inclusiv un „mini-accident vascular cerebral” sau un atac ischemic tranzitoriu, „AIT”).
- aveți hipertensiune arterială, diabet zaharat sau o valoare mare a colesterolului, dacă aveți antecedente familiale de boală de inimă sau accident vascular cerebral sau dacă fumați.
- aveți probleme legate de funcția hepatică sau renală. În cazul utilizării prelungite, este necesară monitorizarea funcției renale, a valorilor analizelor hepatice, precum și a numărului de celule din sânge. În general, utilizarea de rutină a analgezicelor (a mai multor tipuri) poate duce la probleme renale de durată. Acest risc poate crește în cazul epuizării fizice asociate cu pierderi de săruri și deshidratare (de exemplu cauzate de vărsături, diaree sau un aport insuficient de lichide).
- aveți sau ați avut probleme la nivelul tractului digestiv sau o inflamație cronică a intestinului, și anume inflamația colonului (colită ulcerativă) sau boala Crohn.
- se recomandă prudență dacă luați alte medicamente care ar putea crește riscul de ulcerare sau sângerare, de exemplu corticosteroizi administrați pe cale orală (de exemplu prednisolon), medicamente pentru subțierea sângelui (de exemplu warfarină), inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (un medicament pentru depresie) sau antiagregante plachetare (de exemplu acid acetilsalicilic).
- luați alt AINS (incluzând inhibitori de COX-2, de exemplu celecoxib sau etoricoxib), întrucât administrarea concomitentă a acestora trebuie evitată (vezi pct. „Ibuprofen Strides împreună cu alte medicamente”).
- aveți o boală mixtă de țesut conjunctiv (o boală autoimună) sau lupus eritematos sistemic (o boală autoimună).
- aveți anumite tulburări ereditare de formare a sângelui (de exemplu porfirie intermitentă acută).
- aveți tulburări de coagulare.
- vi s-a efectuat recent o intervenție chirurgicală majoră.
- aveți sau ați avut astm bronșic sau orice boală alergică, întrucât pot surveni dificultăți la respirație.
- aveți febra fânului, polipi nazali sau tulburări respiratorii obstructive cronice, întrucât acestea prezintă un risc crescut de reacții alergice. Reacțiile alergice se pot manifesta sub formă de crize de

- astm bronșic (așa-numitul astm indus de analgezice), edem Quincke sau urticarie.
- dacă sunteți deshidratat, întrucât există un risc de insuficiență renală, mai ales la adolescenții deshidratați și la vârstnici.
 - aveți o infecție - vezi titlul „Infecții” de mai jos.
 - Utilizarea prelungită a oricărui tip de analgezic pentru durerile de cap le poate agrava. În cazul în care apare sau se suspectează această situație, trebuie să vă adresați unui medic și să opriți tratamentul.

Reacții la nivelul pielii

S-au raportat reacții grave la nivelul pielii în asociere cu tratamentul cu Ibuprofen Strides. Trebuie să opriți administrarea Ibuprofen Strides și să vă adresați imediat medicului dacă prezentați orice erupție pe piele, leziuni ale mucoaselor, vezicule sau alte semne de alergie, întrucât acestea pot fi primele semne ale unei reacții foarte grave la nivelul pielii. Vezi pct. 4.

Riscul de reacții adverse este redus la minim prin utilizarea celei mai mici doze eficiente, pe o perioadă cât mai scurtă posibil. Pacienții vârstnici prezintă un risc crescut de reacții adverse la AINS, în special sângerare și perforație gastro-intestinală, care pot avea rezultat letal. Nu utilizați mai multe analgezice în același timp, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră v-a spus să procedați astfel.

În cazul tuturor AINS s-a raportat sângerare, ulcerare sau perforație gastro-intestinală, care poate avea rezultat letal, în orice moment pe durata tratamentului, cu sau fără simptome de avertizare sau antecedente de evenimente gastro-intestinale grave. Dacă apare o sângerare sau o ulcerare gastro-intestinală, tratamentul trebuie oprit imediat. Riscul de sângerare, ulcerare sau perforație gastro-intestinală este mai mare odată cu creșterea dozelor de AINS la pacienții cu antecedente de ulcer, mai ales dacă a fost complicat cu sângerare sau perforație (vezi pct. 2 „Ibuprofen Strides”) și la vârstnici. Acești pacienți trebuie să înceapă tratamentul cu cea mai mică doză disponibilă. La acești pacienți, precum și la cei care necesită administrarea concomitentă a unor doze mici de acid acetilsalicilic sau alte medicamente care este probabil să crească riscul gastro-intestinal, trebuie avut în vedere tratamentul asociat cu agenți de protecție (de exemplu misoprostol sau inhibitori ai pompei de protoni).

În special dacă sunt vârstnici, pacienții cu antecedente de toxicitate gastro-intestinală trebuie să raporteze orice simptome abdominale neobișnuite (în special sângerare gastro-intestinală), mai ales în etapele inițiale ale tratamentului.

Infecții

Ibuprofenul poate ascunde semnele de infecție, de exemplu febra și durerea. Prin urmare, este posibil ca ibuprofenul să întârzie tratamentul adecvat al infecției, ceea ce poate duce la un risc crescut de complicații. Această situație a fost observată în cazul pneumoniei cauzate de bacterii și al infecțiilor bacteriene la nivelul pielii asociate varicelei. Dacă luați acest medicament în timp ce aveți o infecție, iar simptomele infecției persistă sau se agravează, solicitați imediat consultul unui medic. Este recomandabil să evitați utilizarea acestui medicament dacă aveți varicelă (vărsat de vânt).

Adresați-vă unui medic dacă oricare dintre afecțiunile menționate mai sus vă îngrijorează.

Copii și adolescenți

Există risc de afectare renală la adolescenții deshidratați.

Ibuprofen Strides împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Ibuprofen Strides poate influența sau poate fi influențat de alte medicamente. De exemplu:

- anticoagulante (adică medicamente care subțiază sângele/previn coagularea, de exemplu acid acetilsalicilic, warfarină, ticlopidină)
- medicamente care reduc hipertensiunea arterială (inhibitori ai ECA, de exemplu captopril, beta-

blocante, de exemplu atenolol, antagoniști ai receptorilor angiotensinei II, de exemplu losartan)

De asemenea, unele medicamente pot influența sau pot fi influențate de tratamentul cu Ibuprofen Strides comprimate.

Prin urmare, trebuie să solicitați întotdeauna sfatul medicului sau al farmacistului înainte de a utiliza Ibuprofen Strides comprimate împreună cu alte medicamente.

În special dacă este vorba despre unul dintre următoarele medicamente:

Alte AINS, inclusiv inhibitori ai COX-2	Deoarece acest lucru poate crește riscul de apariție a reacțiilor adverse
Digoxină (pentru insuficiență cardiacă)	Deoarece efectul digoxinei poate fi potențat
Glucocorticoizi (medicamente care conțin cortizon sau substanțe similare cortizonului)	Deoarece acestea pot crește riscul de apariție a ulcerelor sau a sângerărilor gastrointestinale
Antiagregante plachetare	Deoarece acestea pot crește riscul de sângerare
Acid acetilsalicilic (doză mică)	Deoarece efectul de subțiere a sângelui poate fi afectat
Medicamente pentru subțierea sângelui (de exemplu warfarină)	Deoarece ibuprofenul poate amplifica efectele acestor medicamente
Fenitoină (pentru epilepsie)	Deoarece efectul fenitoinii poate fi potențat
Inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (medicamente utilizate pentru depresie)	Deoarece acestea pot crește riscul de sângerare gastrointestinală
Litiu (un medicament pentru boala maniaco-depresivă și depresie)	Deoarece efectul litiului poate fi potențat
Probenecid și sulfonpirazone (medicamente pentru gută)	Deoarece excreția ibuprofenului poate fi întârziată
Medicamente pentru hipertensiune arterială și comprimate pentru eliminare a apei	Deoarece ibuprofenul poate diminua efectele acestor medicamente și ar putea apărea un risc crescut pentru rinichi
Diuretice care economisesc potasiu, de exemplu amilorid, canrenoat de potasiu, spironolactonă, triamteren.	Deoarece acestea pot duce la hiperpotasemie
Metotrexat (un medicament pentru cancer sau reumatism)	Deoarece efectul metotrexatului poate fi potențat
Tacrolimus și ciclosporină (medicamente imunosupresoare)	Deoarece pot apărea leziuni renale
Zidovudină: (un medicament pentru tratarea HIV/SIDA)	Deoarece utilizarea Ibuprofen Strides poate duce la un risc crescut de sângerare la nivelul unei articulații sau sângerare care duce la edem în cazul persoanelor cu hemofilie și cu test HIV seropozitiv
Sulfoniluree (medicamente antidiabetice)	Deoarece pot fi afectate concentrațiile zahărului din sânge
Antibiotice de tipul chinolonei	Deoarece riscul de convulsii (crize) poate crește
Voriconazol și fluconazol (inhibitori ai CYP2C9), utilizate pentru infecțiile fungice	Deoarece efectul ibuprofenului poate fi potențat. Trebuie să aveți în vedere reducerea dozei de ibuprofen, în special când se administrează doze mari de ibuprofen împreună cu voriconazol sau fluconazol.
Aminoglicozide	AINS pot reduce excreția aminoglicozidelor
Baclofen (medicament pentru tratarea spasticității)	Toxicitatea baclofenului poate să apară după începerea administrării ibuprofenului

Ritonavir (un medicament pentru tratarea infecției cu HIV)	Ritonavirul poate crește concentrațiile plasmatice ale AINS
Colestiramină	În cazul unei administrări concomitente de ibuprofen și colestiramină, absorbția ibuprofenului este întârziată și redusă. Aceste medicamente trebuie administrate la un interval de câteva ore.
Ginkgo biloba	Ginkgo poate crește riscul de sângerare dacă este administrată concomitent cu AINS
Mifepristonă (pentru întreruperea sarcinii)	Dacă AINS sunt utilizate în decurs de 8-12 zile după administrarea de mifepristonă, acestea pot reduce efectul mifepristonei.
Alcool, bifosfonați și oxpentifilină (pentoxifilină)	Pot potența reacțiile adverse gastrointestinale și riscul de sângerare și ulceratie.

Ibuprofen Strides împreună cu alimente, băuturi și alcool

Trebuie să limitați sau să evitați consumul de alcool atunci când luați Ibuprofen Strides, întrucât acesta poate intensifica reacțiile adverse gastrointestinale.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Nu luați Ibuprofen Strides dacă vă aflați în ultimele 3 luni de sarcină, întrucât poate avea efecte dăunătoare asupra fătului sau poate cauza probleme la naștere. Îi poate cauza fătului probleme la rinichi și la inimă. Poate afecta tendința dumneavoastră și a copilului dumneavoastră de a sângera și poate întârzia sau prelungește travaliul.

Nu trebuie să luați Ibuprofen Strides în primele 6 luni de sarcină decât dacă este absolut necesar și dacă medicul dumneavoastră v-a recomandat acest lucru. Dacă aveți nevoie de tratament în această perioadă sau în timp ce încercați să rămâneți gravidă, trebuie să utilizați cea mai mică doză, pe cea mai scurtă perioadă posibil. Dacă este administrat mai mult de câteva zile, începând cu săptămâna 20 de sarcină, Ibuprofen Strides îi poate cauza fătului probleme la rinichi, care pot duce la scăderea nivelurilor de lichid amniotic care înconjoară copilul (oligohidramnios) sau la îngustarea unui vas de sânge (canalul arterial) la nivelul inimii copilului. Dacă aveți nevoie de tratament mai mult de câteva zile, medicul dumneavoastră vă poate recomanda monitorizare suplimentară.

Alăptarea

Ibuprofenul trece în laptele matern, dar este puțin probabil să aibă un efect asupra sugarului, dacă este utilizat în cadrul unui tratament pe termen scurt. Cu toate acestea, adresați-vă unui medic dacă este necesară utilizarea Ibuprofen Strides mai mult decât ocazional în timpul alăptării.

Fertilitatea

Utilizarea ibuprofenului poate afecta fertilitatea. Utilizarea ibuprofenului nu este recomandată atunci când încercați să concepeți un copil sau în timpul investigațiilor pentru infertilitate.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În general, ibuprofenul nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuși, întrucât în cazul dozelor mai mari pot apărea reacții adverse la nivelul sistemului nervos central, cum sunt oboseala și amețea, capacitatea de a reacționa, de a participa în mod activ la traficul rutier și de a folosi utilaje poate fi afectată în situații individuale. Această precizare se aplică într-o măsură mai mare în asocieră cu consumul de alcool.

Ibuprofen Strides conține lactoză

Acest medicament conține un tip de zahăr numit lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Ibuprofen Strides conține sodiu

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per comprimat filmat, adică practic „nu conține sodiu”.

3. Cum să luați Ibuprofen Strides

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Bolile reumatice și umflăturile și inflamația, însoțite de durere, ca urmare a leziunilor țesuturilor moi

Ibuprofen Strides 600 mg comprimate

Adulți

Doza unică este de 300-600 mg de ibuprofen. Doza zilnică recomandată este de 1200-1800 mg, în doze împărțite. Trebuie lăsat un interval de cel puțin 6 ore între doze. Unii pacienți pot fi menținuți la doza de 600-1200 mg zilnic. În afecțiunile severe sau acute, poate fi avantajoasă creșterea dozei până la controlarea fazei acute, cu condiția ca doza zilnică să nu depășească 2400 mg, în doze împărțite.

Adolescenți cu vârsta de cel puțin 15 ani (greutate ≥ 50 kg):

Doza unică este de 300-600 mg de ibuprofen. Doza zilnică recomandată este de 1200-1800 mg, în doze împărțite. Trebuie lăsat un interval de cel puțin 6 ore între doze. Unii pacienți pot fi menținuți la doza de 600-1200 mg zilnic. În afecțiunile severe sau acute, poate fi avantajoasă creșterea dozei până la controlarea fazei acute, cu condiția ca doza zilnică să nu depășească 2400 mg în doze împărțite.

Copii și adolescenți

Ibuprofen Strides 600 mg comprimate filmate nu este indicat la adolescenți cu greutatea sub 50 kg sau la copii sau adolescenți cu vârsta sub 15 ani.

Vârstnici

Dacă sunteți vârstnic, veți fi mai predispus la reacții adverse, mai ales hemoragie, ulcere și perforare a tractului gastrointestinal, care pot fi letale. Medicul dumneavoastră vă va spune doza corectă ce trebuie luată, și anume doza cea mai mică posibil.

Funcție hepatică sau renală redusă

Dacă aveți o funcție renală sau hepatică redusă, medicul dumneavoastră vă va spune doza corectă ce trebuie luată, și anume doza cea mai mică posibil. Nu luați acest medicament dacă aveți insuficiență hepatică sau renală severă.

Mod de administrare

Ibuprofen Strides este pentru utilizare orală.

Luați comprimatele cu un pahar de apă.

Comprimatul poate fi divizat în doze egale.

Se recomandă ca pacienții cu stomac sensibil să ia Ibuprofen Strides cu alimente.

Durata tratamentului

Medicul curant decide durata tratamentului.

În bolile reumatice, utilizarea Ibuprofen Strides poate fi necesară pe o perioadă mai mare.

Dacă luați mai mult Ibuprofen Strides decât trebuie

Dacă ați luat mai mult Ibuprofen Strides decât trebuie sau dacă un copil a luat din greșală acest medicament, adresați-vă întotdeauna unui medic sau celui mai apropiat spital pentru a solicita o opinie privind riscul și recomandări privind măsurile care trebuie luate. Simptomele de supradozaj pot include greață, durere de stomac, vărsături (pot conține urme de sânge), sângerări gastrointestinale (vezi pct. 4 de mai jos), diaree, durere de cap, țiuț în urechi, confuzie și mișcări incontroabile ale ochilor. De asemenea, poate apărea agitație, somnolență, dezorientare sau comă. Ocazional, pacienții pot avea convulsii. La administrarea unor doze mari au fost raportate somnolență, durere în piept, palpitații, pierdere a conștienței, convulsii (în principal la copii), slăbiciune și amețeală, sânge în urină, concentrații scăzute de potasiu în sânge, concentrații ridicate de potasiu în sânge, senzație de rece la nivelul corpului și probleme respiratorii.

Mai mult, timpul de protrombină/INR poate fi prelungit, probabil din cauza interferenței cu acțiunile factorilor circulanți de coagulare. Pot apărea insuficiență renală acută și afectare hepatică. De asemenea, poate apărea agravarea astmului bronșic la pacienții cu astm bronșic. În plus, poate exista tensiune arterială mică și respirație redusă și modificarea culorii pielii și a mucoaselor în albastru-roșu (cianoză).

Dacă uitați să luați Ibuprofen Strides

Nu luați o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. Luați următorul comprimat ca de obicei.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Ibuprofen Strides poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

S-au raportat acumularea de lichid la nivelul țesutului (edem), tensiune arterială mare și insuficiență cardiacă în asociere cu tratamentul cu AINS. Medicamentele ca Ibuprofen Strides pot fi asociate cu un risc ușor crescut de infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

Reacțiile adverse observate cel mai frecvent afectează tractul digestiv. În special la pacienții vârstnici pot apărea ulcere gastrice/duodenale (ulcere peptice), perforație sau sângerare, uneori cu rezultat letal (vezi pct. 2 „Atenționări și precauții”). După utilizare s-au raportat greață, vărsături, diaree, flatulență, constipație, probleme digestive, durere abdominală, scaune de culoare neagră, vărsături cu sânge, leziuni (ulcerații) în regiunea gurii și gâtului (stomatită ulcerativă), agravare a colitei și a bolii Crohn (vezi pct. 2 „Atenționări și precauții”). Mai puțin frecvent s-a observat inflamarea mucoasei stomacului (gastrită). Riscul de apariție a sângerării gastrointestinale depinde în mod special de doza utilizată și de durata tratamentului.

Opriți administrarea Ibuprofen Strides și adresați-vă imediat unui medic dacă prezentați oricare din următoarele simptome:

- reacții generale de hipersensibilitate severă (foarte rare: pot afecta până la 1 din 10 000 persoane). Acestea se pot manifesta prin: umflare a feței, limbii și gâtului, dificultăți la respirație, bătăi mai rapide ale inimii și o scădere a tensiunii arteriale până la șoc cu risc vital. Dacă apare unul dintre aceste simptome, ceea ce se poate întâmpla chiar și la prima utilizare, este necesară asistență medicală imediată.
- durere severă de stomac, în special când începeți să luați Ibuprofen Strides (mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane).
- scaune de culoare neagră, diaree cu sânge sau vărsături cu sânge (mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane).
- febră, durere în gât și în gură, simptome asemănătoare gripei, stare de oboseală, sângerări nazale și la nivelul pielii. Acestea pot fi cauzate de o scădere a numărului de globule albe din sânge (agranulocitoză) (foarte rare: pot afecta până la 1 din 10 000 persoane).
- durere de cap severă sau persistentă (foarte rare: pot afecta până la 1 din 10 000 persoane).
- pete roșii nereliefate pe trunchi, circulare sau de forma unei ținte, adesea cu vezicule centrale, descumare a pielii, ulcerații la nivelul gurii, gâtului, nasului, organelor genitale și ochilor. Aceste

- erupții grave pe piele pot fi precedate de febră și simptome asemănătoare gripei [dermatită exfoliativă, eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică] (foarte rare: pot afecta până la 1 din 10 000 persoane).
- dacă vă apare o erupție pe piele sau leziuni la nivelul mucoaselor. Erupțiile severe pe piele pot include vezicule, mai ales la nivelul picioarelor, brațelor, mâinilor și labelor picioarelor și pot implica și fața și buzele. Această reacție poate deveni chiar și mai severă, atunci când veziculele se măresc și se extind pe suprafețe mai mari, iar porțiuni de piele se pot descuama (necroliză epidermică toxică). De asemenea, poate apărea o infecție severă, cu distrugere (necroză) a pielii, țesutului subcutanat și mușchilor (foarte rare: pot afecta până la 1 din 10 000 persoane).
 - erupție generalizată roșie, scuamoasă, cu umflături sub piele și vezicule, localizată în principal la nivelul pliurilor pielii, trunchiului și extremităților superioare, însoțită de febră, la inițierea tratamentului (pustuloză exantematică generalizată acută) (cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile).
 - Durere în piept, care poate fi semnul unei reacții alergice posibil grave numite sindrom Kounis (frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile).

Alte reacții adverse care pot apărea

- **Foarte frecvente:** pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane
 - simptome gastrointestinale, de exemplu arsuri la stomac, durere de stomac și greață, diaree, vărsături, flatulență (gaze) și constipație
 - sângerare gastrointestinală minoră care, în cazuri excepționale, poate cauza anemie.
- **Frecvente:** pot afecta până la 1 din 10 persoane
 - tulburări ale sistemului nervos central, cum sunt durere de cap, amețeli, insomnie, agitație, iritabilitate și oboseală.
 - ulceratie gastrointestinală, posibil însoțită de sângerare și perforație, stomatită ulcerativă, agravare a unei boli intestinale existente (colită sau boala Crohn), gastrită.
- **Mai puțin frecvente:** pot afecta până la 1 din 100 persoane
 - reacții de hipersensibilitate însoțite de erupție pe piele și mâncărimi, precum și crize de astm bronșic (care pot fi însoțite de o scădere a tensiunii arteriale).
 - eliminarea unei cantități de urină mai mici decât în mod normal și umflare (mai ales la pacienții cu tensiune arterială mare sau afectare a funcției renale); umflare (edem) și urină tulbură (sindrom nefrotic); boală inflamatorie a rinichiului (nefrită interstițială) care poate duce la insuficiență renală acută. Dacă aveți vreunul dintre simptomele de mai sus sau dacă nu vă simțiți bine, nu mai luați Ibuprofen Strides și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, deoarece acestea pot fi primele semne ale afectării rinichilor sau de insuficiență renală.
 - tulburări de vedere
- **Rare:** pot afecta până la 1 din 1 000 persoane
 - tinitus, pierdere a auzului.
 - durerile la nivelul părților laterale ale abdomenului și/sau al abdomenului, prezența sângelui în urină și febra pot fi semne de leziune la nivelul rinichilor (necroză papilară). Concentrații crescute de acid uric în sânge, concentrații crescute de uree în sânge.
- **Foarte rare:** pot afecta până la 1 din 10 000 persoane
 - Dacă apar semne ale unei infecții sau acestea se agravează în timpul utilizării Ibuprofen Strides, trebuie să vă adresați imediat unui medic. Trebuie să se investigheze dacă este indicat un tratament antiinfecțios/antibiotic. La utilizarea ibuprofenului s-au observat simptome ale meningitei aseptice, însoțite de rigiditate a gâtului, durere de cap, greață, vărsături, febră sau confuzie. Pacienții cu tulburări autoimune (lupus eritematos sistemic (LES), boală mixtă de țesut conjunctiv) par predispuși la acestea.
 - probleme legate de producerea de celule din sânge (anemie, leucopenie, trombocitopenie, pancitopenie, agranulocitoză), eozinofilie, coagulopatie (modificări de coagulare), anemie aplastică, anemie hemolitică, neutropenie - primele semne sunt: febră, durere în gât, ulceratii superficiale la nivelul gurii, simptome asemănătoare gripei, epuizare severă, sângerare nazală și la nivelul pielii. În aceste cazuri, trebuie să încetați imediat tratamentul și să vă adresați unui

medic. Nu utilizați niciun autotratament cu analgezice sau medicamente care reduc febra (medicamente antipiretice).

- hipoglicemie, hiponatremie
- reacții alergice severe generalizate (reacții de hipersensibilitate) – semnele pot fi: umflare a feței, limbii și gâtului, dificultăți la respirație, bătăi rapide ale inimii, scădere marcată a tensiunii arteriale până la șoc care poate pune viața în pericol. Dacă apare vreunul dintre aceste simptome, ceea ce se poate întâmpla chiar de la prima utilizare, este necesară asistență medicală de urgență.
- reacții psihotice, halucinații, confuzie, depresie
- furnicături și înțepături (parestezie) și inflamație a nervului optic (nevrită optică)
- s-au raportat palpitații, insuficiență cardiacă, infarct miocardic, edem și tensiune arterială mare în asociere cu tratamentul cu AINS în doze mari.
- hipertensiune arterială, vasculită.
- astm bronșic, dispnee, bronhospasm
- esofagită, pancreatită, formare de stricturi intestinale asemănătoare unor diafragme. În cazul în care prezentați o durere relativ severă în partea superioară a abdomenului, vărsături cu sânge sau scaune de culoare neagră, trebuie să opriți tratamentul și să vă adresați unui medic.
- afecțiuni la nivelul ficatului (primele semne ar putea fi modificarea culorii pielii), în special în cazul tratamentului pe termen lung, insuficiență hepatică, hepatită acută, afectare a funcției hepatice.
- Formele severe de reacții la nivelul pielii includ erupție însoțită de înroșire și vezicule, sindrom Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică (sindrom Lyell), cădere a părului (alopecie).
- În cazuri excepționale pot surveni infecții severe la nivelul pielii și complicații la nivelul țesuturilor moi în timpul varicelei (vărsat de vânt).

- **Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):**

- pielea devine sensibilă la lumină (fotosensibilitate)
- reacție la medicament însoțită de eozinofilie și simptome sistemice (sindrom DRESS)
- pustuloză exantematică generalizată acută (PEGA)
- inflamație a mucoasei nazale (rinită)
- insuficiență renală

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Ibuprofen Strides

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blistere după „EXP”.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Ibuprofen Strides

Substanța activă din acest medicament este ibuprofen. Fiecare comprimat conține ibuprofen 600 mg.

Celelalte componente sunt:

Nucleul comprimatului: Dioxid de siliciu coloidal anhidru, celuloză microcristalină, amidon pregelatinizat (porumb), amidonglicolat de sodiu, talc, stearat de magneziu

Filmul comprimatului: Hipromeloză, dioxid de titan (E171), lactoză monohidrat, macrogol, citrat de sodiu

Cum arată Ibuprofen Strides și conținutul ambalajului

Comprimate filmate ovale, biconvexe, de culoare albă, ștanțate cu „6” pe o față și cu linie mediană pe cealaltă față, cu lungimea de aproximativ 17,7 mm și lățimea de aproximativ 10,6 mm.

Comprimatul poate fi divizat în doze egale.

Comprimatele sunt disponibile în blistere din PVC-Aluminiu și furnizate în ambalaje cu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 și 100 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricanții

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Strides Nordic ApS
Fuglevangsvej 11
1962 Frederiksberg C
Danemarca

Fabricantul:

Fairmed Healthcare GmbH
Maria-Goeppert-Straße 3
23562 Lübeck
Germania

Terapia SA
Strada Fabricii 124,
Cluj Napoca, 400632,
România

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

FI: Ibuprofen Strides 600 mg Kalvopäällysteiset tabletit

AT: Ibuprofen Fairmed 600 mg Filmtabletten

DE: Ibuprofen Fairmed 600 mg Filmtabletten

DK: Ibuprofen Strides

RO: Ibuprofen Strides 600 mg comprimate filmate

SE: Ibuprofen Strides 600 mg filmdragerade tabletter

Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2025.