

Prospect: Informații pentru utilizator**Allergodil 1,5 mg/ml spray nazal, soluție**
clorhidrat de azelastină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Allergodil și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Allergodil
3. Cum să utilizați Allergodil
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Allergodil
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Allergodil și pentru ce se utilizează

Allergodil conține clorhidrat de azelastină care aparține unui grup de medicamente numite antihistamine. Antihistaminele funcționează prin prevenirea efectelor histaminelor pe care le produce organismul ca parte a reacției alergice.

Allergodil este folosit la tratarea rinitei alergice la adulți, adolescenți și copii peste 6 ani. Aceasta reprezintă o reacție alergică la substanțe cum ar fi, de exemplu, polenul, acarienii din praf sau la părul de animale.

De obicei te afectează cauzându-ți curgerea nasului, strănutul, mâncărimea sau înfundarea nasului. Allergodil trebuie să ajute la controlul acestor simptome.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Allergodil**Nu utilizați Allergodil :**

- dacă sunteți alergic la clorhidratul de azelastină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Allergodil adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Copii

Allergodil spray nazal nu este recomandat pentru utilizare la copiii sub vârsta de 6 ani.

Allergodil împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Allergodil spray nazal are o influență minoră asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Rar, pot apărea oboseală sau amețală din cauza bolii propriu-zise, sau când se folosește Allergodil. În aceste cazuri nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje. Vă rugăm să fiți conștienți că aceste efecte pot fi mărite de consumul de alcool.

3. Cum să utilizați Allergodil

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Important:

Dacă nu sunteți sigur care este dozajul corect sau cum să folosiți acest medicament, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și mai mari

- Doza recomandată este de unul sau două pufuri în fiecare nară de două ori pe zi, sau două pufuri în fiecare nară, o dată pe zi, în funcție de severitatea simptomelor.
- Doza zilnică maximă este de două pufuri în fiecare nară de două ori pe zi.

Copii cu vârstă între 6 și 11 ani:

- Doza recomandată este de o pulverizare în fiecare nară o dată sau de două ori pe zi.

Nu se recomandă utilizarea Allergodil la copiii cu vârsta sub 6 ani, datorită lipsei datelor privind siguranța și/sau eficacitatea.

Dacă este posibil, ar trebui să folosiți Allergodil în mod regulat până când simptomele dumneavoastră au dispărut. Dacă întrerupeți utilizarea Allergodil este posibil să vă reapară simptomele.

Cum să utilizați spray-ul

1. Mai întâi suflați nasul.
2. Scoateți capacul protector (Diagrama 1).

3. Înainte de prima utilizare, apăsați pompa de șase ori până când rezultă o pulverizare uniformă (Diagrama 2). Când Allergodil spray nazal nu a fost utilizat timp de trei sau mai multe zile, pompa trebuie apăsată un număr suficient de ori până la apariția unei pulberi fine.
4. Se pulverizează o dată în fiecare nară ținând capul în poziție verticală. Nu înclinați capul pe spate (Diagrama 3).
5. Ștergeți și înlocuiți capacul protector.



Diagrama 1




Diagrama 2




Diagrama 3

Dacă utilizați mai mult Allergodil decât trebuie

Dacă vă pulverizați prea mult Allergodil în nas este puțin probabil să aveți probleme. Dacă sunteți îngrijorat, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă cineva, mai ales un copil, bea Allergodil, adresați-vă medicului dumneavoastră sau celui mai apropiat spital de urgență.

Dacă uitați să utilizați Allergodil

Folosiți spray-ul de îndată ce vă amintiți, apoi luați doza următoare la ora obișnuită. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Aceste efecte includ:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- Un gust neplăcut în gura (mai ales dacă înclinați capul pe spate, atunci când sunt utilizați spray-ul nazal).

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane):

- Iritație ușoară a interiorului nasului (usturime, mâncărime), strănut și sângerare nazală.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane):

- Gustul neplăcut v-ar putea face să vă simțiți rău. Oboseală (fatigabilitate, epuizare), amețeală, slăbiciune sau o senzație de somnolență pot apărea, care pot fi, de asemenea, cauzate de boala în sine.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):

- O reacție alergică, reacție alergică gravă, erupții cutanate, mâncărime sau urticarie.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Allergodil

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare indicată pe eticheta flaconului și pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii.

Aruncați orice medicament neutilizat la 6 luni de la prima deschidere a spray-ului nazal.

Nu depozitați spray-ul în frigider sau congelator.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Allergodil

- Substanța activă este clorhidratul de azelastină. Un ml de spray nazal conține 1,5 mg clorhidrat de azelastină. Fiecare pulverizare (0,14 ml) conține 0,21 mg de clorhidrat de azelastină echivalent cu 0,19 mg azelastină.
- Celelalte componente sunt: hipromeloză, sucraloză, sorbitol, lichid (de cristalizare), edetat disodic, citrat de sodiu și apă purificată.

Cum arată Allergodil și conținutul ambalajului

Allergodil spray nazal este o soluție limpede, incoloră.

Cutie cu un flacon din sticlă brună, capacitate 10 ml, prevăzut cu pompa de pulverizare, aplicator nazal și capac; conține 5 ml soluție

Cutie cu un flacon din sticlă brună, capacitate 10 ml, prevăzut cu pompa de pulverizare, aplicator nazal si capac; conține 10 ml soluție

Cutie cu un flacon din sticlă brună, capacitate 20 ml, prevăzut cu pompa de pulverizare, aplicator nazal si capac; conține 17 ml soluție

Cutie cu un flacon din sticlă brună, capacitate 20 ml, prevăzut cu pompa de pulverizare, aplicator nazal si capac; conține 20 ml soluție

Cutie un flacon din sticlă brună, capacitate 20 ml; prevăzut cu pompa de pulverizare, aplicator nazal si capac; conține 22 ml soluție

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținatorul autorizației de punere pe piață

COOPER CONSUMER HEALTH B.V.

Verrijn Stuartweg 60, 1112AX Diemen, Țările de Jos

Fabricantul

MADAUS GmbH

Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf, Germania

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie, 2025.